Poziom glukozy we krwi

Wynik prawidłowy na czczo **70-99 mg/dl (3,9 – 5,5 mmol/l)**

Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C)

Wartość HbA1C informuje o średnim stężeniu glukozy w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy u pacjenta i świadczy o skuteczności leczenia cukrzycy.

Doustny test tolerancji glukozy (OGTT)

Badanie po 120 minutach od wypicia roztworu glukozy 75g

Wynik prawidłowy **do 140 mg/dl (<7,8 mmol/l)**

STAN PRZEDCUKRZYCOWY

KRYTERIA ROZPOZNANIA NIEPRWIDŁOWEJ GLIKEMII NA CZCZO (IFG):

Poziom glukozy na czczo *(kryteria diagnostyczne)* **100 - 125 mg/dl (5,6 – 6,9 mmol/)**

KRYTERIA ROZPOZNANIA NIEPRAWIDŁOWEJ NIETOLERANCJI GLUKOZY (IGT):

nieprawidłowa tolerancja glukozy glikemia w 120 minucie OGTT **140 - 199 mg/dl (7,8– 11,0 mmol/)**

CUKRZYCA

KRYTERIA ROZPOZNANIA CUKRZYCY:

przygodna glikemia **≥200 mg/dl (11,1 mmol/l)**

typowe objawy hiperglikemii: (wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie)

2-krotnie glikemia na czczo *(oznaczona w innych dniach)* **≥126 mg/dl (7,0 mmol/l)**

glikemia w 120. min OGTT **≥200 mg/dl (11,0 mmol/l)**

Wartość HbA1c *oznaczona w laboratorium metodą certyfikowaną w NGSP* **≥6,5% (48 mmol/mol)**